

Avanafil

Substance active

Important à savoir

- Prenez de l'avanafil environ **15 à 30 minutes avant** d'avoir des **rapports sexuels**.
- Vous ne devez prendre l'avanafil **qu'une fois par jour**.
- Il est préférable de **ne pas consommer d'alcool** lorsque vous prenez de l'avanafil.

Informations temporaires

Les médicaments utilisés pour les troubles de l'érection sont très souvent contrefaits. Vous pouvez acheter ces produits dans un circuit illégal, par exemple sur des sites internet illégaux. **En achetant des médicaments en dehors du circuit légal, vous prenez un risque pour votre santé.** Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet [ici](#).

Quel est l'effet de ce médicament et à quoi sert-il ?

Les médicaments contenant la substance active avanafil sont des médicaments qui entraînent un **relâchement des vaisseaux sanguins du pénis**. Cela permet à **une plus grande quantité de sang d'y circuler lors d'une excitation sexuelle**.

Votre médecin peut vous prescrire de l'avanafil en cas de **troubles de l'érection** (= impuissance). C'est le cas lorsqu'un homme ne peut pas obtenir ou maintenir une érection suffisante avant et pendant les rapports sexuels.

Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ? Sous quelles formes peut-il être administré ?

Pour voir la liste de tous les médicaments associés à cette fiche, visitez [PharmaInfo.be](https://pharma.info.be).

Cette liste contient tous les médicaments avec de l'avanafil. Cliquez sur le nom du médicament pour savoir quelle quantité d'avanafilil contient et sous quelle forme il est administré. Vous trouverez également la notice, des informations sur le prix, le remboursement et la nécessité d'une prescription médicale.

Lisez la notice pour tout savoir sur votre médicament, notamment sur sa composition ou sur les allergies possibles.

Comment prendre ce médicament : En quelle quantité ? À quel moment ? Pendant combien de temps ?

Quelle quantité de ce médicament dois-je prendre ?

Consultez l'**étiquette du pharmacien** pour savoir quelle dose prendre et combien de fois par jour. Sur cette étiquette, vous pouvez lire ce que le **médecin a prescrit**. Si l'information ne figure pas sur l'étiquette et qu'elle ne vous a pas non plus été communiquée lors de votre consultation chez le médecin, il est préférable de d'abord demander **conseil à votre médecin ou à votre pharmacien** ou de lire la **notice**.

L'avanafil est prescrit aux **hommes à partir de 18 ans**.

Vous **ne devez pas prendre plus de 200 mg (milligrammes) par jour** (24 heures), sauf si votre médecin vous l'a prescrit autrement.

À quel moment dois-je prendre ce médicament ?

Prenez de l'avanafil environ **15 à 30 minutes avant** d'avoir des **rapports sexuels**. Ce médicament ne vous aidera à obtenir une érection que si vous avez envie d'avoir des rapports sexuels à ce moment-là.

Vous ne devez prendre l'avanafil qu'une fois par jour.

Vous pouvez prendre de l'avanafil **avec ou sans nourriture**. Si vous prenez l'avanafil pendant le repas ou juste après, il se peut que vous mettiez un peu plus de temps à en ressentir les effets.

Pendant combien de temps puis-je utiliser ce médicament ?

Vous ne devez prendre l'avanafil qu'en cas de nécessité, environ 15 à 30 minutes avant d'avoir des rapports sexuels.

Vous ne devez prendre l'avanafil **qu'une fois par jour au maximum**.

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tout médicament, ce médicament peut avoir des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Contactez votre médecin si, après avoir pris de l'avanafil, vous avez une érection qui dure plus de 4 heures.

Contactez votre médecin si les effets indésirables suivants se produisent, car il s'agit de symptômes de réaction allergique :

- respiration sifflante soudaine ;
- difficultés à respirer ;
- vertiges ;
- gonflement des paupières, du visage, des lèvres ou de la gorge.

Contactez votre médecin si vous ressentez une douleur à la poitrine pendant ou après l'activité sexuelle.

Contactez votre médecin en cas de diminution ou de perte soudaine de la vue.

Les effets indésirables les plus fréquents lors de la prise d'avanafil sont les suivants :

Fréquent (jusqu'à 1 personne sur 10)

- maux de tête ;
- rougeurs au visage ;
- nez bouché.

Parfois (jusqu'à 1 personne sur 100)

- palpitations ;
- bouffées de chaleur (sensation soudaine de chaleur) ;
- vision floue ;
- étourdissements ;
- maux de tête lié aux sinus bouché ;
- nausées et vomissements ;
- troubles digestifs ;
- douleur ou raideur musculaire ;
- douleur dans le dos ;
- somnolence.

Il existe d'autres effets indésirables moins fréquents. La liste complète figure dans la notice du médicament concerné. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) » Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.

Contactez votre médecin ou votre pharmacien si vous ressentez des effets indésirables, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la notice. Vous pouvez également [signaler des effets indésirables directement à l'AFMPS](#).

Puis-je arrêter de prendre ce médicament ?

Oui, vous pouvez arrêter de prendre avanafil à tout moment.

Ne prenez de l'avanafil **qu'en cas de nécessité** : si vous avez l'intention d'avoir des rapports sexuels.

Que dois-je faire si j'ai oublié une dose ou si j'ai pris une quantité trop importante de ce médicament ?

Que dois-je faire si j'ai oublié une dose ?

Prenez de l'avanafil environ 15 à 30 minutes avant d'avoir des rapports sexuels. Si vous avez oublié, prenez votre dose et attendez que l'effet se produise.

Que se passe-t-il si j'ai pris une quantité trop importante de ce médicament ?

Contactez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien ou appelez le Centre Antipoisons (070 245 245).

Vous pouvez présenter les symptômes suivants :

- nausées ;
- augmentation de la tension artérielle ;
- augmentation du rythme cardiaque ;
- troubles du rythme cardiaque.

Puis-je conduire un véhicule ? Puis-je consommer de l'alcool ? Puis-je manger ce que je souhaite ?

Puis-je conduire un véhicule ou utiliser des machines si je prends ce médicament ?

Oui, vous pouvez conduire un véhicule ou utiliser des machines si vous prenez de l'avanafil, **sauf** si vous :

- vous sentez **étourdi** ;
- vous sentez **somnolent** ;
- avez une **vision floue, double** ou **altérée**.

Ce n'est que si vous **ne présentez pas ces symptômes** que vous pouvez **conduire un véhicule ou utiliser des machines**, mais restez toujours prudent.

Puis-je consommer de l'alcool si je prends ce médicament ?

Non, il est préférable de ne pas consommer d'alcool si vous prenez de l'avanafil. L'alcool rend l'érection **plus difficile**.

Puis-je manger normalement si je prends ce médicament ?

Non, vous ne pouvez pas manger ce que vous souhaitez si vous prenez de l'avanafil.

Vous ne pouvez **pas manger de pamplemousse** (ni d'agrumes apparentés comme le pomelo). Vous devez également **éviter les préparations à base de ces fruits**.

Si vous prenez l'avanafil pendant le repas ou juste après, il se peut que vous mettiez un peu plus de temps à en ressentir les effets.

Puis-je prendre ce médicament si je suis enceinte ou si j'allaite ? Ce médicament peut-il affecter ma fertilité ?

L'avanafil est uniquement prescrit aux hommes.

Il n'existe aucune donnée sur l'utilisation de l'avanafil pendant la grossesse ou l'allaitement.

Puis-je prendre ce médicament si je suis enceinte ?

L'avanafil est uniquement prescrit aux hommes.

Il n'existe aucune donnée sur l'utilisation de l'avanafil pendant la grossesse.

Puis-je allaiter lorsque je prends ce médicament ?

L'avanafil est uniquement prescrit aux hommes.

Il n'existe aucune donnée sur l'utilisation de l'avanafil pendant l'allaitement.

Ce médicament peut-il affecter ma fertilité ?

Il n'y a pas d'effet connu sur la fertilité des hommes qui prennent de l'avanafil.

À quoi dois-je faire attention si je prends d'autres médicaments ?

La prise d'avanafil peut entraîner des interactions avec d'autres médicaments ou être influencée par la prise d'autres médicaments. Cet aperçu ne répertorie que les **interactions potentiellement graves**. Consultez votre médecin et/ou votre pharmacien en cas d'utilisation simultanée de ce médicament avec les médicaments suivants :

- certains médicaments en cas d'**insuffisance cardiaque** ;
- certains médicaments contre les **douleurs dans la poitrine à cause d'une diminution de l'aorte** ;
- certains médicaments destinés à traiter l'**hypertension** ;
- certains médicaments contre l'**hypertrophie de la prostate** ;
- **le riociguat**, qui est un médicament utilisé contre l'hypertension dans les poumons ;
- les médicaments **capables de modifier la transformation de l'avanafil par le foie** :
 - le millepertuis (plante médicinale utilisée contre la dépression) ;
 - les médicaments contre le VIH ;
 - certains médicaments contre les champignons ;
 - certains antiépileptiques ;
 - les médicaments contre la tuberculose.

La liste complète des interactions figure dans la notice. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) » Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.

À quoi dois-je faire attention si j'ai d'autres problèmes de santé ?

Ne prenez pas de l'avanafil dans les situations suivantes ou, le cas échéant, consultez d'abord votre médecin et/ou votre pharmacien :

- **allergie** à l'avanafil ;
- **diminution du fonctionnement du foie** (insuffisance hépatique) ;
- **diminution du fonctionnement des reins** (insuffisance rénale) ;
- **tension artérielle très basse** ;
- **problèmes cardiaques graves** ;
- **perte de vision** causée par un blocage des vaisseaux sanguins du nerf optique ;
- **anomalie** de vos **globules rouges** (drépanocytose, leucémie ou cancer de la moelle osseuse).

Pour la liste complète des situations qui demandent une vigilance particulière lorsque vous prenez de l'avanafil, consultez la notice. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) » Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.

Comment conserver ce médicament et pendant combien de temps ?

Comment conserver ce médicament ?

Conservez toujours ce médicament **hors de la portée et de la vue des enfants**.

Conservez ce médicament à **température ambiante** (15 – 25 °C).

Conservez toujours le médicament dans son **emballage d'origine, bien fermé**, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Ne jetez pas vos médicaments dans l'évier ou les toilettes, ni dans la poubelle. Rapportez-les **à votre pharmacie**. Cliquez [ici](#) pour plus d'informations.

Combien de temps puis-je conserver ce médicament ?

N'utilisez **pas ce médicament au-delà de sa date de péremption**. Cette date figure sur la boîte, la plaquette ou l'étiquette. Vous pouvez prendre le médicament jusqu'au dernier jour du mois et de l'année mentionnés après « EXP ».

Cette information a été fournie par PharmaInfo.be, une initiative de l'AFMPS.

Avez-vous encore des questions après avoir lu ces informations ?
Contactez votre médecin ou votre pharmacien.