Ciprofloxacine

Werkzame stof

FarmaInfo
een initiatief van het fagg

Belangrijk om te weten

- Je kan last krijgen van misselijkheid en diarree door ciprofloxacine.
- Neem ciprofloxacine **niet samen in met zuivelproducten**.
- Neem ciprofloxacine **niet samen in met ijzer, magnesium of calcium**.
- Blijf ciprofloxacine innemen **zolang je arts heeft gezegd**, ook als je je al vroeger beter voelt.

Wat doet dit geneesmiddel en waarvoor dient het?

Geneesmiddelen met de werkzame stof ciprofloxacine zijn **antibiotica**.

Je arts schrijft ciprofloxacine voor bij **infecties** in verschillende delen van je lichaam, die veroorzaakt worden door **bacteriën.**

Typische infecties waarbij je arts ciprofloxacine voorschrijft, zijn infecties van de luchtwegen en de urinewegen.

Je arts zal enkel ciprofloxacine voorschrijven als de gebruikelijke antibiotica niet meer werkzaam zijn of bij complexe infecties.

Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België? In welke vormen wordt het toegediend?

Om het overzicht van alle geneesmiddelen te zien die horen bij deze informatiefiche, kijk dan op FarmaInfo.be.

In dit overzicht vind je alle geneesmiddelen die ciprofloxacine bevatten. Je ziet er hoeveel ciprofloxacine ze bevatten en in welke vormen ze worden toegediend. Je vindt er ook de bijsluiter, informatie over de prijs, de terugbetaling, en of je een voorschrift van je arts nodig hebt.

In de bijsluiter vind je alle informatie over je geneesmiddel, zoals de samenstelling of informatie over allergieën.

Er zijn ook geneesmiddelen met ciproflaxacine die op een andere manier worden toegediend. Deze geneesmiddelen worden apart vermeld, voer hiervoor een nieuwe zoekopdracht uit.

Hoe gebruik ik dit geneesmiddel - Hoeveel? Op welk tijdstip? Hoelang?

Hoeveel mag ik van dit geneesmiddel gebruiken?

Kijk op het **etiket van de apotheker** om te weten welke dosis je moet nemen en hoeveel keer per dag. Op dat etiket kan je lezen wat **de arts heeft voorgeschreven**. Staat de informatie niet op het etiket en werd die ook niet gegeven tijdens het gesprek, vraag dan best **eerst advies aan je arts of apotheker** of lees de **bijsluiter**.

Je mag **niet meer innemen dan 1 g (gram) per dag** (24 uur). Deze maximale dosis geldt voor een gemiddelde volwassene.

Bijvoorbeeld: bij de siroop die 50 mg ciprofloxacine per ml bevat, komt dit overeen met 20 ml

(milliliter) van de siroop.

Op welk tijdstip gebruik ik dit geneesmiddel?

Neem ciprofloxacine in op **gelijk welk moment** van de dag, **met of zonder voedsel**. Kies een **vast tijdstip.**

Het is belangrijk dat je ciprofloxacine **niet inneemt samen met zuivelproducten** (zoals melk of yoghurt). Neem daarom ciprofloxacine minstens 2 uur vóór zuivelproducten in, of 4 uur erna.

Neem ciprofloxacine ook **niet samen in met ijzer, magnesium of calcium** (zoals bepaalde vitaminepreparaten, voedingssupplementen of dranken rijk aan calcium zoals met calcium verrijkt sinaasappelsap). Neem daarom ciprofloxacine minstens 2 uur vóór deze producten in, of 4 uur erna.

Hoelang mag ik dit geneesmiddel gebruiken?

Blijf ciprofloxacine innemen **zolang je arts heeft gezegd**, ook als je je al vroeger beter voelt. Je hebt **elke dosis nodig** om de infectie te bestrijden. Als je vroeger stopt, kunnen sommige bacteriën overleven en kan de infectie terugkeren.

Heb je ondanks het gebruik van ciprofloxacine na 3 tot 5 dagen nog evenveel of zelfs meer last van klachten? Neem dan **contact op met je arts**.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop de behandeling en neem contact op met je arts wanneer de volgende bijwerkingen optreden:

- plotse, ernstige pijn in je buik, borstkas of rug;
- huiduitslag zoals blaren en zweren in de mond, keel, neus of ogen, afpellen van de huid;
- toevallen (stuipen);
- je flauw en duizelig voelen;
- pijn of zwelling van je pezen, vooral in je enkel of je kuit;
- pijn, gevoelloosheid, tintelingen, zwelling of spierzwakte in verschillende delen van je lichaam (vaak begint dit aan je handen en voeten) die na verloop van tijd erger worden;
- effecten op je mentale gezondheid (waaronder slaapstoornissen, angst, paniekaanvallen, depressie of zelfmoordgedachten);
- ernstige vermoeidheid, problemen met je geheugen of concentratie;
- veranderingen in je zicht, gehoor, smaak en reuk;
- zwelling in je schouders, armen of benen of pijn in je gewrichten.

De meest voorkomende bijwerkingen bij het gebruik van ciprofloxacine zijn de volgende:

Vaak (tot 1 op 10 mensen)

- misselijkheid;
- diarree.

Soms (tot 1 op 100 mensen)

- braken;
- buikpijn;
- problemen met je spijsvertering;
- winderigheid;
- minder eetlust;

- hoofdpijn;
- duizeligheid;
- minder goed kunnen slapen;
- je opgewonden voelen;
- verandering van je smaak;
- huiduitslag en jeuk;
- netelroos (urticaria);
- spierpijn;
- gewrichtspijn;
- koorts.

Ciprofloxacine kan je **huid gevoeliger maken voor zonlicht**. Daardoor kan je huid sneller verbranden en blaren krijgen. **Bescherm daarom je huid tegen zonlicht.** Hoe je dit kan doen, kan je lezen in het thema 'Opgelet voor zonlicht bij bepaalde geneesmiddelen'. Gelukkig komt deze bijwerking niet veel voor, maar voorkomen is altijd beter dan genezen!

Er zijn nog andere bijwerkingen die minder vaak voorkomen. De volledige lijst wordt vermeld in de bijsluiter van een specifiek geneesmiddel. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: 'Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Neem contact op met je arts of apotheker wanneer je last krijgt van bijwerkingen, ook als die niet in de bijsluiter staan. Je kan bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan het FAGG.



Mag ik zomaar met dit geneesmiddel stoppen?

Nee, je mag een behandeling met ciprofloxacine niet zomaar zonder medisch advies stoppen.

Je hebt **elke voorgeschreven dosis nodig** om de infectie te bestrijden. Als je vroeger stopt, kunnen sommige bacteriën overleven en kan de infectie terugkeren.



Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten of als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Wat als ik een dosis ben vergeten?

Neem je vergeten dosis ciprofloxacine in **zodra je eraan denkt**. **Wacht** daarna zeker **6 uur** voor de inname van de volgende dosis. **Contacteer je arts** als je nog **vragen** zou hebben over het vervolg van je behandeling.

Neem **nooit een dubbele dosis** ciprofloxacine om een vergeten dosis in te halen.

Wat als ik te veel van dit geneesmiddel heb gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met je **arts of apotheker of bel het Antigifcentrum (070 245 245)**.

Je kan volgende klachten krijgen:

- misselijkheid;
- overgeven;
- diarree;
- troebele kleur van urine;
- plasproblemen;
- mindere werking van de nieren.

Mag ik een voertuig besturen? Mag ik alcohol drinken? Mag ik alles eten?

Mag ik een voertuig besturen of machines bedienen als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag een voertuig besturen of machines bedienen als je ciprofloxacine gebruikt, **behalve** als je je **duizelig** voelt.

Enkel wanneer je deze **klachten niet hebt**, mag je **een voertuig besturen of machines bedienen,** maar **blijf altijd voorzichtig**.

Mag ik alcohol drinken als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alcohol drinken als je ciprofloxacine gebruikt.

Er is **geen bekend effect** van alcohol op ciprofloxacine.

Mag ik alles eten als ik dit geneesmiddel gebruik?

Ja, je mag alles eten als je ciprofloxacine gebruikt.

Het is wel belangrijk dat je ciprofloxacine **niet inneemt samen met zuivelproducten** (zoals melk of yoghurt), of met **dranken rijk aan calcium** (zoals met calcium verrijkt sinaasappelsap). Neem daarom ciprofloxacine 1 tot 2 uur vóór zuivelproducten in, of 4 uur erna.

Het is **geen probleem** als je ciprofloxacine inneemt **tijdens een maaltijd die melk of room bevat**. Het wordt alleen een probleem als je ciprofloxacine samen met een apart zuivelproduct inneemt.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Ciprofloxacine wordt afgeraden voor zwangere vrouwen tijdens het eerste trimester van de zwangerschap.

Gebruik geen ciprofloxacine tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap of als je borstvoeding geeft.

Mag ik dit geneesmiddel gebruiken als ik zwanger ben?

Over het gebruik van ciprofloxacine tijdens het eerste trimester van de zwangerschap is onvoldoende bekend om zeker te zijn dat het veilig is. Je arts zal de ernst van je symptomen afwegen tegen het risico voor je kind.

Nee, je mag ciprofloxacine niet gebruiken tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap. Er is een risico op **schadelijke effecten op je baby**.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? **Bespreek** dan het gebruik van ciprofloxacine met je **arts of je apotheker**.

Mag ik borstvoeding geven als ik dit geneesmiddel gebruik?

Nee, je mag ciprofloxacine niet gebruiken als je borstvoeding geeft. Ciprofloxacine wordt **uitgescheiden in de moedermelk** en kan een schadelijk effect hebben op je baby.

Bespreek dit met je arts of apotheker als je borstvoeding geeft en ciprofloxacine moet gebruiken.

Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?

Ciprofloxacine kan een invloed hebben op of worden beïnvloed door andere geneesmiddelen. In dit overzicht worden enkel de **mogelijk ernstige wisselwerkingen** vermeld. Ga hierover in overleg met je arts of apotheker wanneer je dit geneesmiddel gelijktijdig gebruikt met de volgende geneesmiddelen:

- **geneesmiddelen die veel ijzer bevatten (ijzersupplementen)**: neem ciprofloxacine minstens 2 uur vóór deze supplementen in, of 4 uur erna;
- andere geneesmiddelen die ook een stoornis van het hartritme (**QT-verlenging**) kunnen veroorzaken, zoals geneesmiddelen bij hartritmestoornissen, misselijkheid en depressie;
- **ontstekingsremmers zoals cortisone (corticoïden);**
- geneesmiddelen die **toevallen of stuipen** (aanvallen van bewusteloosheid met spiertrekkingen) kunnen veroorzaken, zoals bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van een depressie of een psychose;
- ciprofloxacine kan de **afbraak** van bepaalde geneesmiddelen **vertragen**, wat het **risico** op **bijwerkingen** van deze geneesmiddelen kan verhogen. Onder deze geneesmiddelen vallen onder andere:
  - sommige geneesmiddelen bij kanker;
  - sommige geneesmiddelen bij psychische ziekten;
  - sommige geneesmiddelen bij hartritmestoornissen;
  - sommige geneesmiddelen bij misselijkheid en braken;
  - sommige geneesmiddelen bij astma en COPD;
  - sommige bloedverdunners;
  - sommige verdovende geneesmiddelen;
  - sommige geneesmiddelen bij malaria;
  - sommige geneesmiddelen bij hiv;
  - sommige geneesmiddelen bij pijn of verslaving;
  - sommige antibiotica;
  - sommige geneesmiddelen bij epilepsie;
  - sommige geneesmiddelen bij transplantaties;
  - sommige geneesmiddelen bij jicht;
  - sommige geneesmiddelen bij de ziekte van Alzheimer;
  - sommige gneeesmiddelen bij ADHD of narcolepsie;
  - sommige sterke pijnstillers;
  - sommige geneesmiddelen bij schimmelinfecties;
  - sommige anticonceptiepillen;
  - methadon, een sterke pijnsiller of een geneesmiddel bij drugsverslaving.

De volledige lijst van wisselwerkingen staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: 'Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.

Waarop moet ik letten als ik nog andere gezondheidsproblemen heb?

Gebruik ciprofloxacine niet in de volgende situaties of overleg in dat geval eerst met je arts of apotheker:

- bij risico op een **QT-verlenging** (een stoornis van het hartritme):
  - als je eerder al een QT-verlenging hebt gehad;
  - als je een hartaandoening hebt;
  - als je andere geneesmiddelen gebruikt die een QT-verlenging kunnen veroorzaken (lees

hiervoor de rubriek: 'Waarop moet ik letten als ik nog andere geneesmiddelen gebruik?').

- als je **allergisch** bent voor de groep antibiotica waartoe ciprofloxacine behoort (de chinolonen);

De volledige lijst met situaties waarin je voorzichtig moet zijn bij het gebruik van ciprofloxacine, staat in de bijsluiter. De bijsluiter vind je terug in de rubriek: 'Onder welke namen is dit geneesmiddel beschikbaar in België?'. Klik vervolgens op jouw geneesmiddel in het overzicht.



Hoe bewaar ik dit geneesmiddel - Hoe? Hoelang?

Hoe bewaar ik dit geneesmiddel?

Houd dit geneesmiddel altijd **buiten het zicht en bereik van kinderen**.

Bewaar dit geneesmiddel op **kamertemperatuur** (15 – 25°C).

Bewaar het geneesmiddel altijd in de **goed afgesloten oorspronkelijke verpakking** als bescherming tegen licht en vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Breng ze binnen **in je apotheek**. Klik hier voor meer informatie.

Hoelang bewaar ik dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel **niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum**. De datum is te vinden op de doos, de blisterverpakking of het etiket. Je kan het geneesmiddel gebruiken tot de laatste dag van de maand en het jaar, vermeld na "EXP".

Sommige **siropen** zijn maar **beperkt houdbaar na opening**, bekijk hiervoor de bijsluiter.

Noteer hier al je vragen voor je arts, apotheker of andere zorgverlener.

FarmaInfo
een initiatief van het fagg

Deze informatie werd ter beschikking gesteld door FarmaInfo.be, een initiatief van het FAGG

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen?
Neem contact op met je arts of apotheker.