



### Important à savoir

- La ciprofloxacine peut provoquer des **nausées** et de la **diarrhée**.
- Ne prenez **pas de ciprofloxacine en même temps que des produits laitiers**.
- Ne prenez **pas de ciprofloxacine en même temps que du fer, du magnésium ou du calcium**.
- **Respectez la durée du traitement** recommandé par votre médecin, même si vous vous sentez mieux avant la fin du traitement.



### Quel est l'effet de ce médicament et à quoi sert-il ?

Les médicaments qui contiennent la substance active ciprofloxacine sont des **antibiotiques**.

Votre médecin peut vous prescrire de la ciprofloxacine pour traiter des **infections** touchant différentes parties de l'organisme et ayant une origine **bactérienne**.

Les infections typiques pour lesquelles votre médecin prescrit de la ciprofloxacine sont des infections des voies respiratoires.

Votre médecin vous prescrira de la ciprofloxacine uniquement lorsque les antibiotiques habituels ne sont plus efficaces ou dans le cas d'infections complexes.



### Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ? Sous quelles formes peut-il être administré ?

Pour voir la liste de tous les médicaments associés à cette fiche, visitez [PharmaInfo.be](https://PharmaInfo.be).

Cette liste contient tous les médicaments avec de la ciprofloxacine. Cliquez sur le nom du médicament pour savoir quelle quantité de ciprofloxacine il contient et sous quelle forme il est administré. Vous trouverez également la notice, des informations sur le prix, le remboursement et la nécessité d'une prescription médicale.

Lisez la notice pour tout savoir sur votre médicament, notamment sur sa composition ou sur les allergies possibles.

Certains médicaments contenant de la ciprofloxacine sont administrés différemment. Ces médicaments sont mentionnés ailleurs. Effectuez une [nouvelle recherche](#) pour les trouver.



### Comment prendre ce médicament : En quelle quantité ? À quel moment ? Pendant combien de temps ?

#### Quelle quantité de ce médicament dois-je prendre ?

Consultez l'**étiquette du pharmacien** pour savoir quelle dose prendre et combien de fois par jour. Sur cette étiquette, vous pouvez lire ce que le **médecin a prescrit**. Si l'information ne figure pas sur l'étiquette et qu'elle ne vous a pas non plus été communiquée lors de votre consultation chez le médecin, il est préférable de d'abord demander **conseil à votre médecin ou à votre pharmacien** ou de lire la **notice**.

Vous **ne devez pas prendre plus de 1 g (gramme) par jour** (24 heures). Cette dose maximale s'applique à l'adulte moyen.

*Exemple : un sirop de ciprofloxacine 250 mg/5 ml contient 50 mg de ciprofloxacine par ml. Avec ce dosage, vous ne devez pas prendre plus de 20 ml (millilitres) de sirop par jour.*

### À quel moment dois-je prendre ce médicament ?

Vous pouvez prendre de la ciprofloxacine à **n'importe quel moment** de la journée, **avec ou sans nourriture**.

Mais, il ne faut **pas prendre de ciprofloxacine en même temps que des produits laitiers** (comme le lait ou le yaourt). Il faut prendre la ciprofloxacine au moins 4 heures avant ces produits, ou 2 heures après.

**Ne prenez pas de ciprofloxacine en même temps que du fer, du magnésium ou du calcium** comme dans certaines vitamines, compléments alimentaires ou des boissons riches en calcium comme du jus de fruits enrichi en calcium). Il faut prendre la ciprofloxacine au moins 2 heures avant ces produits, ou 4 heures après.

Il est préférable de prendre votre ciprofloxacine **à heure fixe**.

### Pendant combien de temps puis-je utiliser ce médicament ?

Prenez votre ciprofloxacine **aussi longtemps que votre médecin le recommande** même si vous vous sentez mieux avant la fin du traitement. Pour combattre l'infection, vous devez respecter la durée du traitement que votre médecin a prescrite. Si vous arrêtez plus tôt, certaines bactéries peuvent survivre et l'infection peut réapparaître.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après 2 à 3 jours de traitement, **retournez consulter votre médecin**.



### Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tout médicament, ce médicament peut avoir des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Arrêtez le traitement et contactez votre médecin si les effets indésirables suivants se produisent :

- douleur soudaine et intense dans l'abdomen, la poitrine ou le dos ;
- éruptions cutanées comme des cloques et des blessures dans la bouche, la gorge, le nez ou les yeux, la peau qui pèle ;
- crises d'épilepsie (convulsions) ;
- faiblesse et étourdissement ;
- douleur ou gonflement des tendons, en particulier au niveau de la cheville ou du mollet ;
- douleur, engourdissement, picotement, gonflement ou faiblesse musculaire dans différentes parties du corps (commence souvent par les mains et les pieds) qui s'aggravent avec le temps ;
- effets sur votre santé mentale (y compris des troubles du sommeil, de l'anxiété, des crises de panique, de la dépression ou des pensées suicidaires) ;
- fatigue importante, problèmes de mémoire ou de concentration ;
- changements au niveau de la vision, de l'audition, du goût et de l'odorat ;
- gonflement des épaules, des bras ou des jambes ou des douleurs articulaires.

Les effets indésirables les plus fréquents lors de la prise de ciprofloxacine sont les suivants :

**Fréquent (jusqu'à 1 personne sur 10)**

- nausées ;
- diarrhée.

#### Parfois (jusqu'à 1 personne sur 100)

- vomissements ;
- douleurs au ventre (abdominales) ;
- problèmes digestifs ;
- ballonnements ;
- perte d'appétit ;
- maux de tête ;
- vertiges ;
- diminution de la qualité du sommeil ;
- surexcitation ;
- modification du goût ;
- éruption cutanée et démangeaisons ;
- gonflement de la peau, accompagnées de démangeaisons (urticaire) ;
- douleurs musculaires ;
- douleurs articulaires ;
- fièvre.

La ciprofloxacine peut rendre **votre peau plus sensible au soleil**. Vous pouvez attraper plus facilement des coups de soleil et des cloques. **Protégez donc bien votre peau du soleil**. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche "[Attention au soleil quand vous prenez certains médicaments](#)". Heureusement, cet effet secondaire n'est pas fréquent, mais mieux vaut prévenir que guérir !

Il existe d'autres effets indésirables moins fréquents. La liste complète figure dans la notice du médicament concerné. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) » Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.

Contactez votre médecin ou votre pharmacien si vous ressentez des effets indésirables, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la notice. Vous pouvez également [signaler des effets indésirables directement à l'AFMPS](#).



#### Puis-je arrêter de prendre ce médicament ?

**Non**, vous ne pouvez pas arrêter le traitement par ciprofloxacine sans avis médical.

Vous avez besoin de **toute la dose prescrite** pour combattre l'infection. Si vous arrêtez plus tôt, certaines bactéries peuvent survivre et l'infection peut réapparaître.



#### Que dois-je faire si j'ai oublié une dose ou si j'ai pris une quantité trop importante de ce médicament ?

##### Que dois-je faire si j'ai oublié une dose ?

Prenez la dose de ciprofloxacine oubliée **dès que vous vous en apercevez**. **Attendez au moins 6 heures** avant la dose suivante. **Contactez votre médecin** si vous avez **des questions** quant à la suite du traitement.

Ne prenez **jamais de double dose** de ciprofloxacine pour compenser une dose oubliée.

## Que se passe-t-il si j'ai pris une quantité trop importante de ce médicament ?

Contactez immédiatement **votre médecin ou votre pharmacien ou appelez le Centre Antipoisons (070 245 245)**.

Vous pouvez présenter les symptômes suivants :

- vous avez des nausées ;
- de la diarrhée ;
- votre pipi peut devenir trouble et vous pouvez avoir des difficultés à faire pipi ;
- cela peut être un signe que vos reins fonctionnent un peu moins à cause de trop de ciprofloxacine.



## Puis-je conduire un véhicule ? Puis-je consommer de l'alcool ? Puis-je manger ce que je souhaite ?

### Puis-je conduire un véhicule ou utiliser des machines si je prends ce médicament ?

**Oui**, vous pouvez conduire un véhicule ou utiliser une machine si vous prenez de la ciprofloxacine, **sauf** si vous avez des **vertiges**.

Ce n'est que si vous **ne présentez pas ces symptômes** que vous pouvez **conduire un véhicule ou utiliser des machines**, mais **restez toujours prudent(e)**.

### Puis-je consommer de l'alcool si je prends ce médicament ?

**Oui**, vous pouvez consommer de l'alcool si vous prenez la ciprofloxacine.

Il n'y a **pas d'effet connu** de l'alcool sur la ciprofloxacine.

### Puis-je manger normalement si je prends ce médicament ?

**Oui**, vous pouvez manger normalement pendant votre traitement à la ciprofloxacine.

Mais il ne faut **pas** prendre votre ciprofloxacine en même temps que des produits laitiers (comme le lait ou le yaourt) ou des **boissons riches en calcium** (comme le jus d'orange enrichi en calcium). Il faut donc prendre la ciprofloxacine au moins 2 heures avant ces produits, ou 4 heures après.

La prise de ciprofloxacine **au cours d'un repas fait avec de la crème fraîche ou avec un verre de lait** ne **pose aucun problème**, mais prendre de la ciprofloxacine uniquement avec des produits laitiers oui.



## Puis-je prendre ce médicament si je suis enceinte ou si j'allaité ?

La ciprofloxacine est **déconseillé(e)** aux femmes enceintes pendant le **premier trimestre de la grossesse**.

**Ne prenez pas de la ciprofloxacine** si vous êtes enceinte pendant le **deuxième et troisième trimestres de la grossesse** et si vous allaitez.

### Puis-je prendre ce médicament si je suis enceinte ?

La prise de ciprofloxacine est **déconseillée** pendant le **premier trimestre de la grossesse**.

**Non**, vous ne pouvez pas prendre de la ciprofloxacine pendant le **deuxième et le troisième trimestres de la grossesse**, car cela pourrait être **dangereux pour votre bébé**.

Vous êtes enceinte ou vous essayez de tomber enceinte ? Si c'est le cas, **discutez** de la prise de ciprofloxacine avec **votre médecin et/ou votre pharmacien**.

### Puis-je allaiter lorsque je prends ce médicament ?

**Non**, vous ne pouvez pas prendre de la ciprofloxacine si vous allaitez. La ciprofloxacine **pass**e dans le **lait maternel** et peut avoir un effet nocif pour votre bébé.

Si vous allaitez et que vous devez prendre de la ciprofloxacine, **discutez-en avec votre médecin et/ou votre pharmacien**.



### À quoi dois-je faire attention si je prends d'autres médicaments ?

La prise de ciprofloxacine peut entraîner des interactions avec d'autres médicaments ou être influencée par la prise d'autres médicaments. Cet aperçu ne répertorie que les **interactions potentiellement graves**. Consultez votre médecin et/ou votre pharmacien en cas d'utilisation simultanée de ce médicament avec les médicaments suivants

- **suppléments de fer** : prendre la ciprofloxacine au moins 2 heures avant, ou 4 heures après ;
- d'autres médicaments pouvant également provoquer un problème du rythme cardiaque (**allongement de l'intervalle QT**), comme les médicaments contre les arythmies cardiaques, les nausées et la dépression ;
- **corticostéroïdes** (anti-inflammatoires, la "cortisone") ;
- les médicaments **qui peuvent provoquer des crises d'épilepsie (perte de conscience avec contractions musculaires)**, comme certains médicaments utilisés dans la dépression ou la psychose ;
- ciprofloxacine peut **ralentir l'élimination** de certains médicaments, ce qui peut **augmenter** le risque **d'effets indésirables** de ces médicaments. Parmi ceux-ci, on retrouve:
  - certains médicaments contre le cancer ;
  - certains médicaments contre les maladies psychiques ;
  - certains médicaments contre les troubles du rythme cardiaque ;
  - certains médicaments contre les nausées et les vomissements ;
  - certains médicaments contre l'asthme et la BPCO ;
  - certains anticoagulants ;
  - certains médicaments narcotiques (anesthésiques) ;
  - certains médicaments contre le paludisme ;
  - certains médicaments contre le VIH ;
  - certains médicaments contre la douleur ou la dépendance ;
  - certains antibiotiques ;
  - certains médicaments contre l'épilepsie ;
  - certains médicaments après une transplantation ;
  - certains médicaments contre la goutte ;
  - certains médicaments contre la maladie d'Alzheimer ;
  - certains médicaments contre le TDAH ou la narcolepsie ;
  - certains antalgiques puissants ;
  - certains médicaments contre les infections dues aux champignons ;
  - certaines pilules contraceptives ;
  - la méthadone, un puissant analgésique ou un médicament pour la dépendance aux drogues.

La liste complète des interactions se trouve dans la notice. La notice se trouve dans la section : «[Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) » Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.



## À quoi dois-je faire attention si j'ai d'autres problèmes de santé ?

Ne prenez pas de ciprofloxacine dans les situations suivantes ou, le cas échéant, consultez d'abord votre médecin et/ou votre pharmacien :

- si vous présentez un risque **d'allongement de l'intervalle QT** (un trouble du rythme cardiaque) :
  - si vous avez déjà eu un allongement de l'intervalle QT auparavant ;
  - si vous souffrez d'une maladie cardiaque ;
  - si vous prenez d'autres médicaments susceptibles de provoquer un allongement de l'intervalle QT (veuillez lire à cet effet la rubrique : « À quoi dois-je faire attention si je prends d'autres médicaments ? ») ;
- en cas **d'allergie** à la ciprofloxacine ou au groupe des antibiotiques dont la ciprofloxacine fait partie (les quinolones) ;

Pour la liste complète des situations qui demandent une attention particulière lorsque vous utilisez de la ciprofloxacine, consultez la notice. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) » Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.



## Comment conserver ce médicament et pendant combien de temps ?

### Comment conserver ce médicament ?

Gardez toujours ce médicament **hors de la vue et de la portée des enfants**.

Conservez ce médicament à **température ambiante** (15 – 25 °C).

Conservez toujours le médicament dans son **emballage d'origine, bien fermé**, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Ne jetez pas vos médicaments dans l'évier ou les toilettes, ni dans la poubelle. Apportez-les à **votre pharmacie**. Cliquez [ici](#) pour plus d'informations.

### Combien de temps puis-je conserver ce médicament ?

N'utilisez **pas ce médicament au-delà de sa date de péremption**. Cette date figure sur la boîte, la plaquette ou l'étiquette. Vous pouvez prendre le médicament jusqu'au dernier jour du mois et de l'année mentionnés après « EXP ».

Certains **sirops** ont une **durée de conservation limitée après ouverture**. Consultez la notice pour en savoir plus.

