



Important à savoir

- **Arrêtez** directement de prendre de la colchicine en cas de **diarrhée**, nausées ou vomissements.
- La colchicine doit être **commencée au plus vite**, dès le début de la crise de goutte.
- La colchicine est **toxique** à des **doses élevées**. Il est donc important de bien respecter les doses et d'arrêter le traitement quand il n'y a plus de douleur.



Quel est l'effet de ce médicament et à quoi sert-il ?

Les médicaments contenant la substance active colchicine sont des **médicaments contre la goutte (dépôt d'acide urique dans les articulations)**. Votre médecin peut vous prescrire de la colchicine pour traiter une **crise de goutte**.



Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ? Sous quelles formes peut-il être administré ?

Pour voir la liste de tous les médicaments associés à cette fiche, visitez [PharmaInfo.be](https://pharmainfo.be).

Cette liste contient tous les médicaments avec de la colchicine. Cliquez sur le nom du médicament pour savoir quelle quantité de colchicine il contient et sous quelle forme il est administré. Vous trouverez également la notice, des informations sur le prix, le remboursement et la nécessité d'une prescription médicale.

Lisez la notice pour tout savoir sur votre médicament, notamment sur sa composition ou sur les allergies possibles.



Comment prendre ce médicament : En quelle quantité ? À quel moment ? Pendant combien de temps ?

Quelle quantité de ce médicament dois-je prendre ?

Consultez l'**étiquette du pharmacien** pour savoir quelle dose prendre et combien de fois par jour. Sur cette étiquette, vous pouvez lire ce que le **médecin a prescrit**. Si l'information ne figure pas sur l'étiquette et qu'elle ne vous a pas non plus été communiquée lors de votre consultation chez le médecin, il est préférable de d'abord demander **conseil à votre médecin ou à votre pharmacien** ou de lire la **notice**.

- **Traitement d'une crise de goutte** : vous **ne devez pas prendre plus de 1,5 mg (milligramme) par jour** (24 heures).
- **Prévention d'une crise de goutte** : vous **ne devez pas prendre plus de 1 mg (milligramme) par jour** (24 heures).

Cette dose maximale s'applique à un adulte moyen.

À quel moment dois-je prendre ce médicament ?

Vous pouvez prendre la colchicine à **n'importe quel moment** de la journée, **avec ou sans nourriture**.

Consultez l'**étiquette du pharmacien** pour savoir à quel moment et combien de fois par jour vous devez prendre la colchicine.

Pendant combien de temps puis-je utiliser ce médicament ?

Demandez à votre médecin pendant combien de temps vous devez prendre la colchicine.

Prenez la colchicine **aussi brièvement que possible**, sauf en cas de prise préventive de colchicine.

Lors d'une crise de goutte, une fois la **crise terminée, arrêtez** d'utiliser la colchicine.



Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tout médicament, ce médicament peut avoir des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Cessez le traitement et contactez votre médecin si les effets indésirables suivants se produisent, car il s'agit de symptômes d'un dosage trop élevé : diarrhée, nausées et vomissements.

Les effets indésirables les plus fréquents lors de la prise de colchicine sont les suivants :

- rougeur de la peau ;
- inflammation des nerfs après une utilisation prolongée ;
- dommage au foie ;
- diminution des globules blancs.

Il existe d'autres effets indésirables moins fréquents. La liste complète figure dans la notice du médicament concerné. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.

Contactez votre médecin ou votre pharmacien si vous ressentez des effets indésirables, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la notice. Vous pouvez également [signaler des effets indésirables directement à l'AFMPS](#).



Puis-je arrêter de prendre ce médicament ?

Oui, vous pouvez arrêter de prendre la colchicine, si la **crise** de goutte est terminée.

Si vous prenez ce traitement pour **prévenir** une crise de goutte, il est important de ne pas arrêter la colchicine sans avis médical, car cela pourrait provoquer une nouvelle crise



Que dois-je faire si j'ai oublié une dose ou si j'ai pris une quantité trop importante de ce médicament ?

Que dois-je faire si j'ai oublié une dose ?

Contactez **votre médecin et/ou votre pharmacien** pour savoir si vous pouvez encore prendre la dose oubliée et combien de temps vous devez attendre pour la dose suivante.

Ne prenez **jamais de double dose** de colchicine pour compenser une dose oubliée.

Que se passe-t-il si j'ai pris une quantité trop importante de ce médicament ?

Contactez immédiatement **votre médecin ou votre pharmacien ou appelez le Centre Antipoisons (070 245 245)**.

Vous pouvez présenter les symptômes suivants :

- vomissements ;
- diarrhées ;
- douleurs au ventre.



Puis-je conduire un véhicule ? Puis-je consommer de l'alcool ? Puis-je manger ce que je souhaite ?

Puis-je conduire un véhicule ou utiliser des machines si je prends ce médicament ?

Oui, vous pouvez conduire un véhicule ou utiliser des machines si vous prenez de la colchicine.

Puis-je consommer de l'alcool si je prends ce médicament ?

Non, il est préférable de ne pas consommer d'alcool si vous prenez de la colchicine.

L'alcool peut causer ou aggraver une **crise de goutte**.

Puis-je manger normalement si je prends ce médicament ?

Non, vous ne pouvez pas manger ce que vous souhaitez si vous prenez de la colchicine.

Il ne faut **pas manger de pamplemousse** ou boire du jus de pamplemousse. Le pamplemousse renforce l'effet de la colchicine, ce qui peut augmenter les effets indésirables.



Puis-je prendre ce médicament si je suis enceinte ou si j'allaite ?

La colchicine est déconseillée aux femmes enceintes et à celles qui allaitent.

Puis-je prendre ce médicament si je suis enceinte ?

On en sait trop peu sur la prise de colchicine pendant la grossesse pour garantir que son utilisation pendant celle-ci est sans risques. Votre médecin évaluera la gravité de vos symptômes par rapport aux risques pour l'enfant.

Vous êtes enceinte ou vous essayez de tomber enceinte ? Si c'est le cas, **discutez** de la prise de colchicine avec **votre médecin et/ou votre pharmacien**.

Puis-je allaiter lorsque je prends ce médicament ?

Par précaution, la prise de colchicine est **déconseillée pendant la période de l'allaitement**, car la colchicine passe dans le lait maternel.

Si vous allaitez et que vous devez prendre de la colchicine, **discutez-en avec votre médecin et/ou votre pharmacien**.



À quoi dois-je faire attention si je prends d'autres médicaments ?

La prise de colchicine peut entraîner des interactions avec d'autres médicaments ou être influencée par la prise d'autres médicaments. Cet aperçu ne répertorie que les **interactions potentiellement graves**. Consultez votre médecin et/ou votre pharmacien en cas d'utilisation simultanée de ce médicament avec les médicaments/produits suivants :

- certains médicaments contre le **cholestérol** (statines et fibrates) ;
- certains médicaments peuvent **modifier** la façon dont colchicine est **éliminé par le foie**. Cela peut **influencer son efficacité** ou **augmenter** le risque d'**effets indésirables**. Parmi ces médicaments, on retrouve:
 - certains médicaments contre l'épilepsie ;
 - certains antibiotiques ;
 - certains médicaments contre les infections dues aux champignons ;
 - certains médicaments contre le cancer ;
 - certains médicaments contre le VIH ;
 - certains médicaments contre les troubles du rythme cardiaque ;
 - certains médicaments après une transplantation ;
 - certains médicaments pour l'hypertension et les troubles du rythme cardiaque ;
 - certains médicaments pour la mucoviscidose ;
 - le millepertuis, une plante utilisée contre la dépression.

La liste complète des interactions se trouve dans la notice. La notice se trouve dans la section : «[Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.



À quoi dois-je faire attention si j'ai d'autres problèmes de santé ?

Ne prenez pas de colchicine dans les situations suivantes ou, le cas échéant, consultez d'abord votre médecin et/ou votre pharmacien :

- **diminution du fonctionnement des reins** ou du **foie** (insuffisance rénale ou hépatique).

Pour la liste complète des situations qui demandent une vigilance particulière lorsque vous utilisez de la colchicine, consultez la notice. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.



Comment conserver ce médicament et pendant combien de temps ?

Comment conserver ce médicament ?

Conservez toujours ce médicament **hors de la portée et de la vue des enfants**.

Conservez ce médicament à **température ambiante** (15 – 25 °C).

Conservez toujours le médicament dans son **emballage d'origine, bien fermé**, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Ne jetez pas vos médicaments dans l'évier ou les toilettes, ni dans la poubelle. Rapportez-les à **votre pharmacie**. Cliquez [ici](#) pour de plus amples informations.

Combien de temps puis-je conserver ce médicament ?

N'utilisez **pas** ce médicament **au-delà de sa date de péremption**. Cette date figure sur la boîte, la plaquette ou l'étiquette. Vous pouvez prendre le médicament jusqu'au dernier jour du mois et de l'année mentionnés après « EXP ».

