



Important à savoir

- Prenez le piroxicam **aussi brièvement que possible** et à la dose la **plus faible possible**.
- Il est préférable de **ne pas consommer d'alcool** lorsque vous prenez du piroxicam.
- Ne prenez **pas** de piroxicam **pendant la grossesse et/ou l'allaitement**.
- Le piroxicam ne **convient pas** pour soulager une **douleur banale, légère ou transitoire**.



Quel est l'effet de ce médicament et à quoi sert-il ?

Les médicaments contenant la substance active piroxicam sont des **anti-inflammatoires**. Votre médecin peut vous prescrire du piroxicam en cas de **douleurs et d'inflammation** :

- crise d'**arthrose** ;
- **polyarthrite rhumatoïde** ;
- **spondylarthrite ankylosante**.



Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ? Sous quelles formes peut-il être administré ?

Pour voir la liste de tous les médicaments associés à cette fiche, visitez [PharmaInfo.be](https://pharmainfo.be).

Cette liste contient tous les médicaments avec du piroxicam. Cliquez sur le nom du médicament pour savoir quelle quantité de piroxicam il contient et sous quelle forme il est administré. Vous trouverez également la notice, des informations sur le prix, le remboursement et la nécessité d'une prescription médicale.

Lisez la notice pour tout savoir sur votre médicament, notamment sur sa composition ou sur les allergies possibles.



Comment prendre ce médicament : En quelle quantité ? À quel moment ? Pendant combien de temps ?

Quelle quantité de ce médicament dois-je prendre ?

Consultez l'**étiquette du pharmacien** pour savoir quelle dose prendre et combien de fois par jour. Sur cette étiquette, vous pouvez lire ce que le **médecin a prescrit**. Si l'information ne figure pas sur l'étiquette et qu'elle ne vous a pas non plus été communiquée lors de votre consultation chez le médecin, il est préférable de d'abord demander **conseil à votre médecin ou à votre pharmacien** ou de lire la **notice**.

Le piroxicam est prescrit aux **adultes et aux adolescents à partir de 16 ans**.

Vous **ne devez pas prendre plus de 20 mg (milligrammes) par jour** (24 heures), sauf si votre médecin vous l'a prescrit. Cette dose maximale s'applique à un adulte moyen.

À quel moment dois-je prendre ce médicament ?

Vous pouvez prendre le piroxicam à **n'importe quel moment** de la journée **pendant un repas** (afin de

réduire les risques de troubles gastro-intestinaux).

Si vous devez prendre ce médicament sur une période prolongée (> 7 jours), il est préférable de prendre ce traitement à **heure fixe**.

Consultez l'**étiquette du pharmacien** pour savoir à quel moment vous devez prendre le piroxicam.

Pendant combien de temps puis-je utiliser ce médicament ?

Demandez à votre médecin pendant combien de temps vous devez prendre le piroxicam.

Prenez le piroxicam **aussi brièvement que possible**. Une fois que les **symptômes** de douleur et d'inflammation ont **disparu, arrêtez** d'utiliser le piroxicam.

Si, malgré la prise de piroxicam, vous ressentez toujours les mêmes symptômes après quelques jours, ou si les symptômes se sont aggravés : contactez **votre médecin**.

Si vous prenez du piroxicam pour de l'arthrose, le traitement est de maximum 15 jours. En cas d'**utilisation prolongée, parlez-en à votre médecin**.



Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tout médicament, ce médicament peut avoir des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Arrêtez le traitement et contactez votre médecin si les effets indésirables suivants se produisent :

- éruption cutanée progressive avec apparition de cloques ou de blessures ;
- hémorragie (saignement), ulcère ou perforation de l'intestin (sang dans les selles, nouvelle douleur abdominale) ;
- hépatite et jaunisse.

Les effets indésirables les plus fréquents lors de la prise de piroxicam sont les suivants :

Fréquent (jusqu'à 1 personne sur 10)

- troubles gastro-intestinaux : nausées, vomissements, diarrhée, gaz, constipation, douleurs abdominales et indigestion ;
- lésions gastro-intestinales : inflammation de l'estomac (gastrite), plus rarement ulcère, vomissements de sang (hématurie) ou sang dans les selles ;
- stomatite (blessures et gonflement dans la bouche) ;
- exacerbation de la colite et de la maladie de Crohn ;
- acouphène, vertiges, maux de tête.

Le piroxicam peut rendre **vos** **peau plus sensible au soleil**. Vous pouvez attraper plus facilement des coups de soleil et des cloques. **Protégez donc bien votre peau du soleil**. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche "[Attention au soleil quand vous prenez certains médicaments](#)". Heureusement, cet effet secondaire n'est pas fréquent, mais mieux vaut prévenir que guérir !

Il existe d'autres effets indésirables moins fréquents. La liste complète figure dans la notice du médicament concerné. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.

Contactez votre médecin ou votre pharmacien si vous ressentez des effets indésirables, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la notice. Vous pouvez également [signaler des effets indésirables directement à l'AFMPS](#).



Puis-je arrêter de prendre ce médicament ?

Oui, vous pouvez arrêter de prendre du piroxicam. Il est conseillé d'arrêter le médicament **dès que les symptômes ont disparu.**



Que dois-je faire si j'ai oublié une dose ou si j'ai pris une quantité trop importante de ce médicament ?

Que dois-je faire si j'ai oublié une dose ?

Prenez-le **dès que vous vous en souvenez**, ou à l'heure habituelle s'il est presque l'heure de la dose suivante.

Ne prenez **jamais de double dose** de piroxicam pour compenser une dose oubliée.

Que se passe-t-il si j'ai pris une quantité trop importante de ce médicament ?

Contactez immédiatement **votre médecin, votre pharmacien ou appelez le Centre Antipoisons (070 245 245).**

Vous pouvez présenter les symptômes suivants :

- troubles digestifs ;
- vertige ;
- vision floue ;
- coma.



Puis-je conduire un véhicule ? Puis-je consommer de l'alcool ? Puis-je manger ce que je souhaite ?

Puis-je conduire en véhicule ou utiliser des machines si je prends ce médicament ?

Oui, vous pouvez conduire un véhicule ou utiliser une machine si vous utilisez du piroxicam, **sauf si vous :**

- ressentez des **troubles de la vision** ou avez une **vision floue** ;
- vous sentez **étourdi(e)** ;
- vous sentez **somnolent(e)** ;
- avez déjà ressenti ces symptômes avec d'autres anti-inflammatoires.

Ce n'est que si vous **ne présentez pas ces symptômes** que vous pouvez **conduire un véhicule ou utiliser des machines**, mais **restez toujours prudent(e)**.

Puis-je consommer de l'alcool si je prends ce médicament ?

Non, il est préférable de ne pas consommer d'alcool si vous prenez du piroxicam.

L'**alcool renforce** les effets indésirables gastro-intestinaux et augmente le risque de saignements gastro-intestinaux.

Puis-je manger normalement si je prends ce médicament ?

Oui, vous pouvez manger normalement pendant votre traitement au piroxicam.

Il n'y a **pas d'effet connu** de l'alimentation sur le piroxicam.



Puis-je prendre ce médicament si je suis enceinte ou si j'allaité ?

Ne prenez pas de piroxicam si vous êtes enceinte.

Le piroxicam est déconseillé si vous allaitez.

Puis-je prendre ce médicament si je suis enceinte ?

Non, ne prenez pas de piroxicam pendant la grossesse. Il existe un risque d'**effets nocifs pour votre bébé**.

Vous êtes enceinte ou vous essayez d'être enceinte ? Si c'est le cas, **discutez** de la prise de piroxicam avec **votre médecin et/ou votre pharmacien**.

Puis-je allaiter lorsque je prends ce médicament ?

La prise de piroxicam est **déconseillée pendant l'allaitement**.

Le médecin peut décider de vous prescrire du piroxicam pendant l'allaitement, et il vous suivra alors de près.

Si vous allaitez et que vous souhaitez prendre du piroxicam, **discutez-en avec votre médecin et/ou votre pharmacien**.



À quoi dois-je faire attention si je prends d'autres médicaments ?

La prise de piroxicam peut entraîner des interactions avec d'autres médicaments ou être influencée par la prise d'autres médicaments. Cet aperçu ne répertorie que les **interactions potentiellement graves**. Consultez votre médecin et/ou votre pharmacien en cas d'utilisation simultanée de ce médicament avec les médicaments suivants :

- d'autres **anti-inflammatoires** et **acide acétylsalicylique** ;
- des anti-inflammatoires comme la **cortisone** (corticostéroïdes) ;
- **anticoagulants** ;
- certains médicaments contre la **dépression** ;
- le **lithium** (médicament contre la dépression) ;
- certains médicaments contre l'**hypertension** ;
- certains **diurétiques** ;
- certains médicaments **antirejet** (après une transplantation) ;
- la **colestyramine** (médicament pour diminuer les graisses dans le sang) ;
- la **digoxine** (médicament pour l'insuffisance cardiaque) ;
- le **méthotrexate** (médicament contre le cancer, le psoriasis ou les rhumatismes).

La liste complète des interactions figure dans la notice. La notice se trouve dans la section : «[Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.



À quoi dois-je faire attention si j'ai d'autres problèmes de santé ?

Ne prenez pas de piroxicam dans les situations suivantes ou, le cas échéant, consultez d'abord votre

médecin et/ou votre pharmacien :

- **allergie** au piroxicam, à d'autres anti-inflammatoires ou à l'acide acétylsalicylique ;
- pour les comprimés, **galactosémie** (mauvaise assimilation du galactose, un sucre qui se trouve dans beaucoup d'aliments) ;
- pour les comprimés effervescents, **phénylcétonurie** (maladie rare causée par l'accumulation d'un acide aminé, la phénylalanine) ;
- diminution du fonctionnement du cœur (**insuffisance cardiaque grave**) ;
- diminution du fonctionnement du foie (**insuffisance hépatique grave**) ;
- diminution du fonctionnement des reins (**insuffisance rénale grave**) ;
- **antécédents d'ulcère** ;
- **antécédents de saignement ou de perforation gastro-intestinale** ;
- **antécédents de rectocolite hémorragique, de maladie de Crohn, de cancers gastro-intestinaux, de diverticulite** ;
- **antécédent de réaction allergique grave à des médicaments.**

La liste complète des situations dans lesquelles vous devez être prudent(e) en cas de prise de piroxicam se trouve dans la notice. La notice se trouve dans la section : « [Sous quels noms ce médicament est-il disponible en Belgique ?](#) ». Cliquez ensuite sur votre médicament dans l'aperçu.



Comment conserver ce médicament et pendant combien de temps ?

Comment conserver ce médicament ?

Conservez toujours ce médicament **hors de la portée et de la vue des enfants**.

Conservez ce médicament à **température ambiante** (15 – 25 °C).

Conservez toujours le médicament dans son **emballage d'origine, bien fermé**, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Ne jetez pas vos médicaments dans l'évier ou les toilettes, ni dans la poubelle. Rapportez-les à votre **pharmacie**. Cliquez [ici](#) pour de plus amples informations.

Combien de temps puis-je conserver ce médicament ?

N'utilisez **pas** ce médicament **au-delà de sa date de péremption**. Cette date figure sur la boîte, la plaquette ou l'étiquette. Vous pouvez prendre le médicament jusqu'au dernier jour du mois et de l'année mentionnés après « EXP ».

